



Rökare löper större risk i radonhus

Publicerad: 25 januari 2001

Författare: Fredrik Norman

Nu har radondebatten åter blossat upp efter att nya uppgifter lagts fram angående riskerna att utsättas för höga radonvärden. I Sverige drabbas runt 2700 personer varje år av lungcancer och enligt en undersökning från Strålskyddsinstitutet ligger radon bakom 500 av fallen. Största delen av de lungcancerfall där radon är inblandat är personen ifråga rökare. Man löper alltså mycket större risk att drabbas av cancer som rökare än ickerökare i en bostad med förhöjda värden. Kan tyckas vara helt logiskt men enligt undersökningen har radon en samverkan med rökning och många dödsfall skulle kunna förhindras om drabbade bostäderna sanerades.

I centrala Lindesberg ligger hela västra stadsdelen från Sundsbron i söder till Prästbron i norr i ett högriskområde. Förklaringen till det är att den delen av staden vilar på en ås som helt naturligt ger högre värden, enligt Miljökontoret. –Ja, det är ett högriskområde, men det betyder inte att bostäder i området har förhöjda värden inomhus. Är huset byggt på ett riktigt sätt med god ventilation och robust grundplatta finns det ingen som helst risk. Det är känt att bl a Palmgrenska har högre värden i källaren, men det beror på att huset är så pass gammalt, förklarar miljöchef Hans-Olof Hake. Radon varken syns, luktar eller smakar och kan endast upptäckas med mätutrustning. Den som känner oro eller kanske misstänker att ens bostad har höga radonvärden kan vända sig till miljökontoret för att få hjälp att göra mätning i bostaden.

Läs mer om radon och Strålskyddsinstitutets undersökning: [Klicka här>>](#)

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/rokare-loper-storre-risk-i-radonhus/>